

# Ohta's Isan

## 太田胃散

衛署藥輸字第 019627 號  
醫師藥師藥劑生指示藥品

芳香性健胃消化藥  
自然(生藥)の良さを生かした胃腸薬

### 【有效成分及含量】

成 分		(1.3g)中
健 胃 劑	Cinnamon Bark	92 mg
	Fennel	24 mg
	Nutmeg	20 mg
	Clove	12 mg
	Citrus Unshiu Peel	22 mg
	Gentian	15 mg
	Powdered Picrasma Wood	15 mg
制 酸 劑	Sodium Bicarbonate	625 mg
	Precipitated Calcium Carbonate	133 mg
	Magnesium Carbonate	26 mg
	Synthetic Aluminum Silicate	273.4 mg
消 化 酵 素	Biodiastase	40 mg
其 他 成 分	(賦形劑) / - Menthol	

### 【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良，幫助消化。

### 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一)3歲以下。
  - (二)消化道潰瘍的人。
  - (三)有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
  - (四)有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。
  - (五)有腎臟疾病的人。
  - (六)須限鹽飲食的人。
  - (七)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二)與其他藥品並用時。
  - (三)對於牛奶或乳製品耐受度低的人。

### 四、其他使用上注意事項：

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量。
- (四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (五)如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- (六)腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
- (七)可能引起腹脹、打嗝。
- (八)含鋁制酸成分可能會引起便秘或腹瀉，偶有噁心、嘔吐。

### 【用法用量】

餐後或兩餐之間服用。

年 齡	1次量	服用次數
成人(15歲以上)	1匙(1.3g)	1日3次
8~14歲	半匙(0.65g)	
未滿8歲	不宜服用	

### 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】盒裝：每包1.3公克鋁箔、100包以下。

罐裝：1000公克以下。【儲存】25°C以下。

製造廠：株式会社 太田胃散 藥商：幼祥實業股份有限公司  
OHTA'S ISAN Co., Ltd. 台北市新東街15巷13號

【公司地址】3-2, Sengoku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

【廠址】957 Shishiko-cho, Ushiku-shi, Ibaraki-ken, Japan

【包裝廠】台灣陽生製藥工業股份有限公司

【地址】屏東縣屏東市龍華路381號

