



緩解胃部不適或灼熱感·幫助消化
太田胃腸錠

Ohta's Isan A Tablet

太田胃腸錠，能促進消化，調節胃中酸度，因而減輕(緩和)胃的負擔，是改善胃腸不舒服症狀之胃腸藥。

◎ 對於因脂肪、肉類引起的“胃脹難受”有效。

Biodiastase 1000、Lipase AP6、Ursodeoxycholic Acid、Prozyme 6消化脂肪、肉類、澱粉，對於油膩及暴飲暴食所引起的胃脹難受，有很好的效果。

◎ 凡消化不良、胃脹難受時，請於飯後或兩餐間服用，也建議睡前服用。

◎ 錠劑吞食容易，能使胃達到舒暢，咀嚼後服用亦可。

【有效成分及含量】

	成 分	每 錠 中	作 用
消 化 劑	Lipase AP6	6.67 mg	幫助澱粉、蛋白質及脂肪的消化。 促進膽汁分泌。
	Prozyme 6	3.33 mg	
	Biodiastase 1000	6.67 mg	
	Ursodeoxycholic Acid	1.4 mg	
制 酸 劑	Sodium Bicarbonate	170 mg	不同作用的制酸劑，具有調整胃中酸度，保護胃壁的效果。
	Synthetic Hydrotalcite	100 mg	
	Precipitated Calcium Carbonate	30 mg	
健 胃 生 藥	Cinnamon Oil	1.16 mg	具有生藥成分和健胃作用，促進胃液的分泌及胃的蠕動。
	Fennel Oil	0.18 mg	

本產品單次劑量(3錠)之酸中和能力為 16.71 mEq，鎂含量為 5.94 mEq，鈉含量為 6 mEq。

其他成分(賦形劑): *l*-Menthol, Lactose, Yellow No.4 (Tartrazine), Acacia, Magnesium Stearate, Magnesium Carbonate, Carmellose Calcium, Microcrystalline Cellulose, Vitamin E Oil, Lemon Oil

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，幫助消化。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 3歲以下。
 - (二) 消化道潰瘍的人。
 - (三) 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
 - (四) 有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。
 - (五) 有腎臟疾病的人。



(六) 須限鹽飲食的人。

(七) 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二) 與其他藥品並用時。
- (三) 對於牛奶或乳製品耐受度低的人。

四、其他使用上注意事項：

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (五) 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- (六) 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
- (七) 可能引起腹脹、打嗝。
- (八) 含鋁制酸成分可能會引起便秘或腹瀉，偶有噁心、嘔吐。

【用法用量】

年 齡	1 次量	1 日服用次數
成人 (12 歲以上)	3 錠	3~4 次
6~12 歲	1.5 錠	
3~6 歲	0.5 錠	
未滿 3 歲	請洽醫師診治，不宜自行使用	

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

18 錠～1000 錠玻璃瓶裝，鋁箔盒裝

【儲存】25℃以下

製造廠：株式会社 太田胃散
OHTA'S ISAN Co., Ltd.

公司地址：3-2, Sengoku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

廠址：957 Shishiko-cho, Ushiku-shi, Ibaraki-ken, Japan

<http://www.ohta-isan.co.jp/>

藥商：幼祥實業股份有限公司
台北市新東街 15 巷 13 號