

太田胃散**Ohta's Isan****【有效成分及含量】**

成 分		每包(1.3 g)中
健 胃 劑	Cinnamon Bark	92 mg
	Fennel	24 mg
	Nutmeg	20 mg
	Clove	12 mg
	Citrus Unshiu Peel	22 mg
	Gentian	15 mg
	Powdered Picrasma Wood	15 mg
制 酸 劑	Sodium Bicarbonate	625 mg
	Precipitated Calcium Carbonate	133 mg
	Magnesium Carbonate	26 mg
	Synthetic Aluminum Silicate	273.4 mg
消 化 酵 素	Biodiastase	40 mg
其 他 成 分	(賦形劑) <i>l</i> -Menthol	

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良，幫助消化。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 3歲以下。
 - (二) 消化道潰瘍的人。
 - (三) 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
 - (四) 有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。
 - (五) 有腎臟疾病的人。
 - (六) 須限鹽飲食的人。
 - (七) 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二) 與其他藥品並用時。
 - (三) 對於牛奶或乳製品耐受度低的人。

四、其他使用上注意事項：

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (五) 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- (六) 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
- (七) 可能引起腹脹、打嗝。
- (八) 含鋁制酸成分可能會引起便秘或腹瀉，偶有噁心、嘔吐。

【用法用量】

餐後或兩餐之間服用。

年齡	1次量	服用次數
成人(15歲以上)	1包	1日3次
8~14歲	1/2包	
未滿8歲	不宜服用	

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

盒裝：每包 1.3 公克鋁箔、100 包以下。

罐裝：1000 公克以下。

【儲存】25℃以下

製造廠：株式會社 太田胃散

OHTA'S ISAN Co., Ltd.

藥商：幼祥實業股份有限公司

台北市新東街 15 巷 13 號

公司地址：3-2, Sengoku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

廠址：957 Shishiko-cho, Ushiku-shi, Ibaraki-ken, Japan

